

Informationsblatt für Eltern

über die
Termine der Entwicklungskontrollen
 und
Impfungen von Säuglingen, Kleinkindern und Kindern

Wir arbeiten gerne mit der Elternberatung Mittelbünden/Chur und bei Bedarf mit der Kinderabteilung des Kantonsspitals Chur zusammen.

Alter	Ärztlicher Untersuch	Impfungen	Bemerkungen
1 Monat	Ja	Keine	Vitamin-K-Gabe (Tropfen in den Mund).
2 Monate	Ja	1te Diphtherie, Starrkrampf, Keuchhusten (DTP), Kinderlähmung (Polio), Hirnhautentzündung (Hib), Hepatitis B (HBV) 1.te Pneumokokken (PCV 13) 1.te Rotaviren (RSV)	Sechsfach Kombinationsimpfung mit Hepatitis B Prevenar ist gegen Lungen- und Ohrenentzündung Orale Verabreichung, monoventale attenuierte Lebendimpfstoff
4 Monate	Ja	2te Diphtherie, Starrkrampf, Keuchhusten (DTP), Kinderlähmung (Polio), Hirnhautentzündung (Hib), Hepatitis B (HBV) 2.te Pneumokokken (PCV 13) 2.te Rotaviren (RSV)	Sechsfach - Kombinationsimpfung mit Hepatitis B Prevenar ist gegen Lungen- und Ohrenentzündung Orale Verabreichung, monoventale attenuierte Lebendimpfstoff
6 Monate	Ja	Keine	-
9 Monate	Ja	1te Masern-Mumps-Röteln (MMR) → Mit oder ohne Varizellen	Auf Wunsch und sehr sinnvoll, die Varizellenimpfung (Windpocken). Es gibt eine Kombinationsimpfung MMR und Varizellen zusammen.

1 Jahr	Ja	3te Diphtherie, Starrkrampf, Keuchhusten (DTP), Kinderlähmung (Polio), Hirnhautentzündung (Hib), Hepatitis B (HBV) 3.te Pneumokokken (PCV 13) 2te Masern-Mumps-Röteln (MMR) → Mit oder ohne Varizellen	-
18 Monate	Ja	Evtl. Start Zeckenimpfung (3-malige Impfung)	Auf Wunsch. (Kann man ab 1 Jahr impfen)
2 Jahre	Ja	1ste Meningokokken Impfung (Menveo)	Hirnhautentzündung
3 Jahre	Ja	kein / evtl. Zeckenimpfung	-
4 ½ Jahre	Ja	Diphtherie-Starrkrampf-Keuchhusten- Kinderlähmung	Eine Auffrischimpfung 4-fach Kombinationsimpfung
5 Jahre	Ja	Keine	-
6 Jahre	Ja, vor Schuleintritt	Keine / Start Zeckenimpfung	Ab jetzt ist die Zeckenimpfung sehr sinnvoll!
9 Jahre	Ja	Gardasil 9 (Gebärmutterhals Krebs-impfung): Start zwischen 9-11 Jahren	Gegen Gebärmutterhalskrebs und andere Krebsarten, auch beim Manne
11-12 Jahre	Ja	Diphtherie- Starrkrampf-Keuchhusten Start Hepatitis B → (Falls als Säugling nicht bereits geimpft) 2.te Meningokokken Impfung (Menveo)	Eine Auffrischimpfung Hepatitis B zum Nachimpfen: 2 Impfungen (Schema 0/6 Monate) Hirnhautentzündung
14 Jahre	Nein	Evtl. noch Impfungen nachimpfen	-
15-16 Jahre	Ja vor Schulaustritt	Evtl. noch Impfungen nachimpfen	-

01/24 mf/ca